

Преждевременные роды: международная проблема

Ротару А.В. – заочный аспирант каф. акушерства и
гинекологии, врач госпиталя ОАР

Обоскалова Т.а. – зав. каф. акушерства и
гинекологии УГМУ

2018г.


Актуальность исследования.

- Этиология и патогенез преждевременных родов до конца не изучены. Преждевременные роды в 22—27 нед беременности (масса плода от 500 до 1000 г) чаще всего обусловлены истмико-цервикальной недостаточностью, инфицированием нижнего полюса плодного пузыря и преждевременным его разрывом.
- Преждевременные роды при сроке гестации 28—33 нед (масса плода 1000—1800 г) и преждевременные роды при сроке гестации 34—37 нед (масса плода 1900—2500 г и более) обусловлены разнообразными причинами: возрастом женщины (до 20 лет и старше 35 лет), преэклампсией, многоплодной беременностью и т.д.
- Наибольший процент прерывания беременности приходится на сроки 34—37 нед. беременности, тогда как в сроки беременности 22—27 нед этот показатель в 12 раз ниже.
- Высокая заболеваемость и смертность недоношенных новорожденных отмечается в ранних сроках — 22—33 нед гестации.

Цель исследования


- Изучить особенности анамнеза женщин с преждевременными родами в стране с жарким климатом (ОАЭ)
- Материалы: медицинские карты родильниц, проживающих в странах Ближнего Востока и родивших в ОАЭ в сроках беременности свыше 28 недель в родовспомогательном учреждении 2-го уровня, n= 30

Страна проживания, %



На учёте в женской консультации состояли 66,7% беременных


Возраст, %



Средний возраст $32,7 \pm 4,7$ года (18 – 46 лет)

1/3 родильниц в позднем репродуктивном возрасте

Социальный статус, %



Паритет беременности и родов

Число беременностей (%)

Всего	1-3	4-6	7 и более
5,5 $\pm$ 2,8 1:16	33,3	33,3	33,3

Число родов (%)

Всего	0	1-3	4 и более
3,9 $\pm$ 2,3 1:14	13,0	47,6	38,1

Планирование семьи

Использование контрацепции(%)			
Нет	Презервативы диафрагма	ВМС	Прерванный половой акт
76,2%	4,8	4,8	9,5

Аборты в анамнезе 46,7%

Внематочная беременность 0

Самопроизвольный выкидыш 0

Последняя беременность и роды

Число абдоминальных родов в анамнезе (%)

Всего		1-3	4 и более
46,7 $\pm$ 2,3 1:4		78,	21,4

Интервал после последнего кесарева сечения

Менее 2-х лет – 42,8% 2-4 года – 42,8%

5 и более лет – 14,3%

Срок беременности к моменту родов (%)

Менее 34 нед.	34-35 нед.	35-36 нед.	36-37 нед.
10,0	13,3	36,7	40,0

Осложнения последней беременности

- Гестационная АГ -10,0%
- Гестационный СД – 16,7%
- Инфекция мочевыводящих путей – 26,7%
- Средний уровень гемоглобина $108,6 \pm 5,4$ г/л
- Анемия – 73,4%

Уровень гемоглобина (%)			
Менее 100 г/л	101-110 г/л	111-115 г/л	116-120 г,л
16,7	40,0	13,3	26,6%

Выводы

- Беременные имеют высокий риск преждевременных родов, обусловленный многочисленными беременностями и родами, малым интергенетическим интервалом, высокой частотой анемии, абдоминальными родами в анамнезе
- Наличие рубца на матке после неоднократного КС является причиной повторного абдоминального родоразрешения
- Эффективную контрацепцию использует малое число женщин, что формирует новые факторы риска преждевременных родов

Благодарю за внимание!